

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL  
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :

2.134.810

(A utiliser que pour  
le classement et les  
commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national

71.14113

(A utiliser pour les paiements d'annuités  
les demandes de copies officielles et toutes  
autres correspondances avec l'INPI)

## (15) BREVET D'INVENTION

PREMIÈRE ET UNIQUE  
PUBLICATION

(22) Date de dépôt ..... 21 avril 1971, à 15 h.  
Date de la décision de délivrance ..... 13 novembre 1972.  
Publication de la délivrance ..... B.O.P.I. — «Listes» n. 49 du 8-12-1972.

(51) Classification internationale (Int. Cl.) C 07 d 91/00.

(71) Déposant : ARIES Robert, 69, rue de la Faisanderie, Paris (15).

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire :

(54) Dérivés thiazole-carboxyliques du ditertiobutyl phénylthiopropane.

(72) Invention de : Robert Aries.


(33) (32) (31) Priorité conventionnelle :

/1 14115

2154810

La présente invention se rapporte à des produits industriels nouveaux constitués par des esters dérivés des acides thiazole-carboxyliques et des bis(hydroxy-4 phénylthio)alcanes.

Les composés visés par l'invention sont définis par la formule générale I ci-après :



Dans cette formule R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;

15 R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;


R''' représente un reste tertioamyle ou tertiobutyle ;

R''' représente un reste alcoyle léger.

Les composés de l'invention possèdent des propriétés pharmacodynamiques hypocholestérolémiantes et hypolipémiants.

20 L'invention vise aussi les procédés de fabrication des composés définis par la formule générale ci-dessus.

Ces procédés consistent dans l'action de l'halogénure ou de l'anhydride de l'acide thiazole-3 carboxylique sur un bis(hydroxy-4 phénylthio)alcane de formule générale II suivante :



dans laquelle R', R'', R''' et R''' sont tels qu'ils ont été précisés précédemment.

La réaction est effectuée, de préférence, dans un liquide 35 inerte servant de solvant ou support, comme par exemple, un hydrocarbure, un éther-oxyde, un hétérocycle oxygéné, un N,N-dialcoylamide ou leurs mélanges ; on opère, de préférence, à une température supérieure à celle de l'ambiante comme, par exemple, celle du reflux du solvant ou support utilisé.

On opère, de préférence, en présence d'une base destinée à fixer l'acide halohydrrique déplacé dans la réaction, ladite base pouvant être, par exemple, un hydroxyde ou un carbonate alcalin, une amine tertiaire ou un hétérocycle azoté tertiaire, ces derniers pouvant servir en partie ou en totalité de solvant des réactifs en présence. On peut aussi utiliser un dérivé U-métallique préalablement isolé du bis(hydroxy-4 phénylthio)alcane.

#### Exemple 1

10 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

268 grammes (0,5 mole) de bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane et 101 grammes (1 mole) de triéthylamine sont introduits dans 4 litres de benzène sec ; on ajoute peu à peu 148 grammes (1 mole) de chlorure de thiazole-5 carbonyl ; on agite pendant 30 minutes puis porte progressivement au reflux qu'on maintient pendant 30 minutes ; on filtre, sans refroidir, pour éliminer le chlorhydrate de triéthylamine puis évapore le benzène sous pression réduite ; on lave avec un peu de pentane et sèche sous vide.

#### Exemple 2

En remplaçant le bis(ditertiobutyl-3,5 hydroxy-4 phénylthio)-2,2 propane par une quantité équimoléculaire d'un autre bis (hydroxy-4 phénylthio)alcane, conforme à la formule II, dans la réaction de l'exemple 1, on peut, notamment, obtenir les composés suivants :

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1 propane

Bis /-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-1,1

30 éthane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 butane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio]-2,2 hexane

35 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio]-2,2 propane

Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane

40 Bis/-(thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio]-2,2 propane

71 14113


2134810

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phenyl-  
thio ]-1,1 ethane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phenyl-  
thio ]-2,2 pentane

REVELICATIONS

1°. Produits industriels constitués par les composés définis par la formule générale I suivante :



10 dans laquelle R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;

R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;

R''' représente un reste tertioamyle ou tertiobutyle ;

15 R'''' représente un reste alcoyle léger.

2°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 propane

3°. Produits industriels conformes à la première revendication

20 constitués par les composés suivants :

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ]-1,1 propane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ]-1,1 éthane

25 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 butane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertiobutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 hexane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio ]-2,2

30 propane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio ]-2,2 propane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio ]-2,2 propane

35 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio ]-1,1 éthane

Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertiobutyl-5 phénylthio ]-2,2 pentane

4°. Procédé de fabrication consistant dans l'action d'un


40 halogénure ou d'un anhydride dérivés de l'acide thiazole-5

71 14113

2134810

REVELATIONS

1°. Produits industriels constitués par les composés définis par la formule générale I suivante :




- 10 dans laquelle R' représente un reste alcoyle léger ou un atome d'hydrogène ;  
 R'' représente un reste méthyle ou éthyle ;  
 R''' représente un reste tertioamyle ou tertibutyle ;
- 15 R''' représente un reste alcoyle léger.
- 2°. Produit industriel conforme à la première revendication constitué par le Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 propane
- 3°. Produits industriels conformes à la première revendication constitués par les composés suivants :
- 20 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio ]-1,1 propane  
 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio ]-1,1 éthane  
 25 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 butane  
 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertibutyl-3,5 phénylthio ]-2,2 hexane  
 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 ditertioamyl-3,5 phénylthio ]-2,2 propane  
 30 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 méthyl-3 tertibutyl-5 phénylthio ]-2,2 propane  
 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio ]-2,2 propane  
 35 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio ]-1,1 éthane  
 Bis[ (thiazole-5 carboxy)-4 isopropyl-3 tertibutyl-5 phénylthio ]-2,2 pentane
- 4°. Procédé de fabrication consistant dans l'action d'un
- 40 halogénure ou d'un anhydride dérivés de l'acide thiazole-5

71 14113

3

2134810

carboxylique sur un bis(hydroxy-4 phénylthio)alcane défini  
par la formule générale II suivante :



- 3°. Procédé conforme à la revendication 4 caractérisé par la  
présence dans le milieu réactionnel d'une base minérale ou  
d'une amine tertiaire ou d'un hétérocycle azoté tertiaire.
- 15 6°. Procédé conforme à la revendication 4 caractérisé par  
l'emploi d'un dérivé O-métallique du bis(hydroxy-4 phénylthio)  
alcane de formule II.